Уважаемые коллеги!

Мы благодарим всех, кто прислал ответы на вопросы тестового контроля, опубликованные в предыдущем номере нашего журнала.

Правильные ответы на вопросы тестового контроля, опубликованные в в «Русском журнале детской неврологии» № 3/2014, стр. 59:

1-й вопрос – ответ 4;
2-й вопрос – ответ 2;
3-й вопрос – ответ 8;
4-й вопрос – ответ 2;
5-й вопрос – ответ 4;
6-й вопрос – ответ 8.

Сегодня мы вновь предлагаем вам проверить свои знания и ответить на предложенные вопросы. Ответы присылайте в редакцию по почте или e-mail: rjdn@epileptologist.ru.

Правильные ответы будут опубликованы в следующем номере журнала.

ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬ

Выберите один правильный ответ

I. Какие изменения в головном мозге могут встречаться при туберозном склерозе?
1. Кортикальные туберы.
2. Субэпендимальные гигантоклеточные астроцитомы.
3. Субэпендимальные узлы.
4. Все перечисленное.
5. Нет правильного ответа.

II. Какие клинические проявления, связанные с поражением нервной системы, характерны для туберозного склероза?
1. Эпилептические приступы.
2. Задержка развития, нарушение обучения.
3. Аутизм.
4. Тикоидные гиперкинезы.
5. Хореические гиперкинезы.
6. Верны 1, 2, 3.
7. Верны 3, 4, 5.

III. Что является мишенью и каков механизм действия для антиэпилептического препарата перампанел?
1. Натриевые каналы (блокада).
2. Натриевые каналы (активация).
3. Гамма-аминомасляная кислота (блокада рецепторов).
4. Гамма-аминомасляная кислота (потенцирование действия).
5. Дофамин (блокада рецепторов).
6. Дофамин (увеличение выброса).
7. AMPA-рецепторы (ингибирование).
8. Повышение глутаматергической активности.
9. Кальциевые каналы (блокада).
10. Ингибирование карбоангидразы.
11. Натриевые каналы (селективно усиливает медленную инактивацию, не влияя на быструю инактивацию).
12. Взаимодействие с белком – медиатором коллапсина-2.
13. Верны 1, 9, 10.
14. Верны 2, 3, 7.
15. Верны 11, 12.

IV. Что является мишенью и каков механизм действия антиэпилептического препарата зонисамид?
1. Натриевые каналы (блокада).
2. Натриевые каналы (активация).
3. Гамма-аминомасляная кислота (блокада рецепторов).
4. Гамма-аминомасляная кислота (потенцирование действия).
5. Дофамин (блокада рецепторов).
6. Дофамин (увеличение выброса).
7. AMPA-рецепторы (ингибирование).
8. Повышение глутаматергической активности.
9. Кальциевые каналы (блокада).
10. Ингибирование карбоангидразы.
11. Натриевые каналы (селективно усиливает медленную инактивацию, не влияя на быструю инактивацию).
12. Взаимодействие с белком – медиатором коллапсина-2.
13. Верны 1, 9, 10.
14. Верны 2, 3, 7.
15. Верны 11, 12.

V. Что является мишенью и каков механизм действия антиэпилептического препарата лакосамид?
1. Натриевые каналы (блокада).
2. Натриевые каналы (активация).
3. Гамма-аминомасляная кислота (блокада рецепторов).
4. Гамма-аминомасляная кислота (потенцирование действия).
5. Дофамин (блокада рецепторов).
6. Дофамин (увеличение выброса).
7. AMPA-рецепторы (ингибирование).
8. Повышение глутаматергической активности.
9. Кальциевые каналы (блокада).
10. Ингибирование карбоангидразы.
11. Натриевые каналы (селективно усиливает медленную инактивацию, не влияя на быструю инактивацию).
12. Взаимодействие с белком – медиатором коллапсина-2.
13. Верны 1, 9, 10.
14. Верны 2, 3, 7.
15. Верны 11, 12.