

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Мы благодарим всех, кто прислал ответы на вопросы тестового контроля, опубликованные в предыдущем номере нашего журнала. Те, кто ответил правильно на большую часть вопросов, смогут регулярно получать наш журнал бесплатно.

Правильные ответы на вопросы тестового контроля, опубликованные в прошлом номере журнала (Русский журнал детской неврологии: т. VIII, вып. 2, 2013, стр. 47):

1ый вопрос — ответ 4; **2ой вопрос** — ответ 1; **3ий вопрос** — ответ 5; **4ый вопрос** — ответ 5;

5ый вопрос — ответ 1; **6ой вопрос** — ответ 1; **7ой вопрос** — ответ 4; **8ой вопрос** — ответ 3.

Сегодня мы вновь предлагаем вам проверить свои знания и ответить на предложенные вопросы. Ответы присылайте в редакцию по почте или E-mail: RJCN@epileptologist.ru, center@epileptologist.ru.

Первые пять врачей, приславших правильные ответы, получают возможность оформить бесплатную подписку на «Русский журнал детской неврологии».

Правильные ответы будут опубликованы в следующем номере журнала.

ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬ

Выберите один правильный ответ

1. При генетическом анализе выявлена трисомия 21 хромосомы. Укажите характерные изменения головного мозга пациентов с этим синдромом:

1. Микроцефалия
2. Макроцефалия
3. Скафоцефалия
4. Гидроцефалия
5. Уменьшение количества извилин
6. Уменьшение размера лобных долей
7. Увеличение количества извилин (полимикририя)
8. Возможно уплощение затылочных долей
9. Верно: 1,5,6,8
10. Верно: 2,3,4,7

2. Какие изменения головного мозга не характерны для пациентов с трисомией 21 хромосомы:

1. Микроцефалия
2. Макроцефалия
3. Уменьшение количества извилин
4. Уменьшение размера лобных долей
5. Увеличение количества извилин (полимикририя)
6. Возможно уплощение затылочных долей
7. Верно: 2,5
8. Верно: 1,3

3. Назовите синдром, в основе которого – трисомия 21 хромосомы:

1. Синдром Тернера.
2. Синдром Клайнфельтера
3. Синдром Дауна
4. Синдром ломкой X-хромосомы
5. Синдром Рейе
6. Туберозный склероз

4. Как называется вариант краниостеноза, при котором происходит раннее закрытие сагиттального шва:

1. Скафоцефалия
2. Брахицефалия
3. Плаггиоцефалия
4. Тригоноцефалия

5. Какой вариант краниостеноза встречается наиболее часто?

1. Скафоцефалия
2. Брахицефалия
3. Плаггиоцефалия
4. Тригоноцефалия

6. Как называется вариант краниостеноза, при котором происходит преждевременное закрытие метопического (лобного) шва. Данный тип краниостеноза встречается примерно в 10% случаев из всех вариантов краниостеноза. В переводе с греческого, буквально «треугольная голова» (голова в форме капли или кия)?

1. Скафоцефалия
2. Брахицефалия
3. Плаггиоцефалия
4. Тригоноцефалия

7. Как называется синостоз коронарного шва? Это второй по частоте тип краниостеноза:

1. Скафоцефалия
2. Брахицефалия
3. Лобная плаггиоцефалия
4. Затылочная плаггиоцефалия
5. Тригоноцефалия

8. Как называется разновидность краниостеноза, отличающаяся высоким отношением показателя наибольшей ширины головы к наибольшей длине:

1. Скафоцефалия
2. Брахицефалия
3. Лобная плаггиоцефалия
4. Затылочная плаггиоцефалия
5. Тригоноцефалия